

Fiche technique

OXYPY+

Désinsectisant pour usage intérieur.



- OXYPY+** est un produit de désinsectisation pour usage intérieur.
- OXYPY+** est à utiliser spécifiquement pour les traitements contre les puces et punaises de lit.
- OXYPY+** est une solution prête à l'emploi conçue pour être utilisée avec le diffuseur **NEBUL'ASEPT**.



REFERENCE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Conditionnement
54019	Bidon de 1L

COMPOSITION

S-methoprène 0.5% • EC=613-834-0 / CAS=65733-16-6.
 Pyrethrine 2% • EC=232-319-8 / CAS=8003-34-7.
 Pyperonyl butoxide 5% • EC=200-076-7 / CAS=51-03-6.

CONSERVATION

- Conserver le produit dans l'emballage d'origine, verticalement et dans un endroit frais et bien ventilé.
- Validité : Dans l'emballage d'origine fermé :
 - 2 ans à partir de la date de fabrication.
 - Une fois désoperculé : 2 mois à partir de la date d'ouverture.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de sécurité du produit, disponibles sur demande à votre commercial de référence.

MODE D'EMPLOI

Protocole d'utilisation

- a. Suivre les instructions d'utilisation de l'appareil de diffusion **NEBUL'ASEPT** (cf. notice d'utilisation).
- b. Agiter le flacon avant chaque utilisation.
- c. Visser le flacon d'1L sur l'appareil de diffusion **NEBUL'ASEPT**.
- d. Enlever le matelas du lit et mettre en évidence toutes les parties difficilement accessibles.
- e. Nettoyer (si possible avec un système vapeur) tous les tissus, bois de lit et structures apparentes où les œufs de punaises peuvent se déposer puis aspirer avec soin (avec un aspirateur).
- f. Appliquer le produit dans tous les recoins du lit à l'aide du pulvérisateur fourni.
- g. Laisser le matelas sur la tranche et commencer ensuite le traitement de la pièce.
- h. Régler l'appareil **NEBUL'ASEPT** selon la notice d'utilisation.
- i. Après la fin de la diffusion, respecter un temps de contact de 2 heures et aérer suite la pièce pendant 10 minutes.
- j. Retirer la bouteille après utilisation et la refermer. Il est conseillé ensuite de procéder à des traitements d'entretien préventifs toutes les 6 semaines.

Traitement d'entretien

Suivre les mêmes instructions que pour le premier traitement sauf pour le réglage de l'appareil (régler l'appareil sur le volume de la pièce).

IMPORTANT :

- Pendant tout le fonctionnement de la machine et le temps de contact, laisser la pièce fermée et ne pas entrer dans la pièce. Le traitement doit être réalisé en dehors de toute présence humaine.